

Matthew Brigger, MD, MPH

Division Chief

Morgan Bliss, MD

Daniela S. Carvalho, MD

Wen Jiang, MD

Shelby Leuin, MD

Anthony E. Magit, MD, FAAP

Javan Nation, MD

Seth M. Pransky, MD, FAAP

Fellow:

Alex Manteghi, MD

Physician Assistant:

Denise M. Lago, PA-C

Main Office:

3030 Children's Way

Suite 112

San Diego, CA 92123

(858) 309-7701

(858) 966-8038 Fax

Regional Offices:

Encinitas

(760) 944-5545

Escondido

(760) 755-7600

Murrieta

(951) 600-1640

Oceanside

(760)547-1020

www.RCSSD.org

Revised 07/15

INSTRUCCIONES PÓS OPERATIVAS IMPLANTE COCLEAR

¿Qué esperar después de la cirugía de implante coclear?

- **Dolor:** leve a moderado, de 1 a 7 días (niños más grandes tienen más dolor). Si el dolor es leve su niño puede tomar Tylenol, pero si el dolor es más fuerte, administre Tylenol con codeína. EVITAR MEDICINAS CON ASPIRINA O CON IBUPROFENO (MOTRIN, ADVIL).
- **Hinchado:** un poco de hinchazón detrás la oreja es normal después de la cirugía. Esto se debe de mejorar dentro de 3 a 7 días. **Siempre** habrá un abultado donde está el implante, y esto es normal. Lo que no puede pasar es que este hinchado con líquido dentro en la primera semana después de la cirugía. Llame al doctor inmediatamente si esto pasa.
- **Vértigo:** Algunos niños pueden tener mareo de 2 días a 2 semanas después de la cirugía. Esto mejora lentamente, tome precaución para que el (ella) no se lastime si tiene mareo.

Cuidado después de la cirugía:

- Remueva la venda 2 días después de la cirugía.
- La incisión tiene un pegamiento de piel especial. Mantener la región seca por 7 días (puede bañarse del cuello para abajo). Después de los 7 días empezar a limpiar la región con agua y jabón (y también lavar el pelo con champú).

Medicaciones

- Dolor: Tylenol y Tylenol con codeína(o Vicodin para niños más grandes)
- Antibióticos: _____ por 7 días

Dieta

Regular

Actividades

Normalmente su niño puede volver a actividades normales 24 horas después de la cirugía, siempre evitando que se lastime la cabeza.

- Escuela: puede volver 7 días después de la cirugía
- Actividades en "Playgrounds": con supervisión, 7 a 10 días después de la cirugía
- PE (educación física): 1 mes después de la cirugía.
- Natación: 2 semanas después de la cirugía.

Cita para seguimiento:

1 semana después de la cirugía.

¿Cuándo llamar el doctor?

Temperatura mayor de **103**, **sangramiento** exagerado, **dolor** excesivo, **hinchado** excesivo, **rojo** detrás de la oreja o si hay diferencia de movimiento de la cara (el lado donde fue la cirugía se mueve menos que el otro lado).

¿Que numero llamar?: 858 309-7701