



## Immunizaciones e implantes cocleares: preguntas frecuentes

¿Qué tipo de vacunas (inmunizaciones) debe recibir mi hijo(a) antes de recibir un implante coclear?

Para ser considerados para una implantación coclear, los niños deben tener: evidencia de vacunas previas o la intención de los padres de seguir adelante con las vacunas recomendadas por la CDC:

Lista de verificación de inmunización	Recomendado
Haemophilus influenzae tipo b (Hib)  [No se necesita una dosis de 6 meses para PedvaxHIB]	2 meses
	4 meses
	6 meses
	12-15 meses
	Alcanzar
Conjugado neumocócico (PCV 13)	2 meses
	4 meses
	6 meses
	12-15 meses
	Alcanzar
Polisacárido neumocócico (PPSV23)	≥ de 2 años de edad (consulte la nota final para niños mayores que no han recibido PCV 13)
Influenza	Temporada actual de influenza

¿Qué pasa si mi hijo no ha recibido ninguna de estas vacunas?

Su hijo(a) debe estar al día con las vacunas mencionadas para ser programado(a) para la cirugía de implante coclear. Comuníquese con el médico de su hijo(a) o con el departamento de salud local para programar una cita para completar estas vacunas.

¿Por qué son importantes estas vacunas?

Los niños que tienen un implante coclear tienen una mayor probabilidad de contraer un tipo de meningitis (infección alrededor del cerebro). Estas vacunas ayudan al cuerpo de su hijo(a) a combatir los tipos de bacterias que pueden causar esta infección.

El Centro para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) tiene información sobre las inmunizaciones (vacunas) para las personas que tienen implantes cocleares.

Recomendaciones de vacunación antineumocócica para niños con implantes cocleares:

**Edades 2-5**

- Administre 2 dosis de PCV13 si no están vacunados o recibieron una serie incompleta de PCV13 con dosis de <3. Administre la segunda dosis al menos 8 semanas después de la primera.
- Administre 1 dosis de PCV13 si recibieron 3 dosis de PCV13, pero ninguna se administró después de los 12 meses de edad.
- Administre 1 dosis de PPSV23 al menos 8 semanas después de que se complete la serie PCV13.

**Edades 6-18**

- Administre 1 dosis de PCV13 si no ha recibido ninguna dosis de PCV13. Administre PCV13 antes de administrar las dosis recomendadas de PPSV23.
- Administre 1 dosis de PPSV23 (si no se ha administrado antes en la infancia) al menos 8 semanas después de la PCV13.

**Edades 19-20**

Nota para niños mayores que no han recibido PCV13:

- Administre 1 dosis de PCV13 y 1 dosis de PPSV23. Administre PCV13 primero, luego administre la dosis de PPSV23 al menos 8 semanas después.

¿Dónde puedo obtener más información?

---

El sitio web del CDC es:

<http://www.cdc.gov/vaccines/vpdvac/mening/cochlear/dis-cochlear-gen.htm>.