Rady Children's Specialists of San Diego
A Medical Foundation

UC San Diego
SCHOOL OF MEDICINE

Advancing the future of pediatric healthcare…together.

Pediatric Otolaryngology

Matthew T. Brigger, M
FAAP, MPH

Division Chief

Morgan Bliss, MD

Daniela S. Carvalho, MD,FAAP

Wen Jiang, MD

Shelby Leuin, MD

Anthony E. Magit, MD, FAAP, MPH

Jeremy Yang, MD

Elina Kari, MD

Tina Friesen, MD

Vijay Patel, MD

Ethan Frank, MD

Zhen Qian, MD

Gopi Shah, MD

Physician Assistant:

Virginia Floco, PA-C

Sallie Reyes, PA-C

Anita Lazar, PA-C

Kristina McCauley, PA-C

Megan Copeland, PA-C

Ashley Sheng, P.A.-C

Melissa Spence, PA-C

Alyssa Odneal, PA-C

Main Office:
3030 Children's Way
1st floor
San Diego, CA 92123
(858) 309-7701
(858) 966-4062 Fax
Regional Offices:
Encinitas
(760) 944-5545
Escondido
(760) 755-7600
Murrieta
(951) 600-1640

Infecciones de Oído con Tubitos : Una Guía cuando hay drenaje del Oído

Durante el tiempo que su niño(a) tenga tubitos de ventilación, podrá experimentar drenaje ya sea de uno o los dos oídos. El drenaje (termino medico= otorrea) puede ser una secreción mucosa ya sea delgada o espesa. Puede variar el color de blanco a amarillo o verde y puede contener algo de sangre. Puede hasta llegar a tener un mal olor. Generalmente el tener drenaje del oído no es peligroso a los oídos. Hay ocasiones en que su hijo (a) se quejara de molestias y habrá otras ocasiones en que su hijo (a) no tendrá molestias.

Hay dos razones por cual el oído drena. La primera y más común, es cuando hay una infección de oído similar a la cual hubo y se le recomendó los tubitos de ventilación. En este caso, el tubito se coloca y empieza a funcionar apropiadamente y empieza a drenar el fluido retenido causado por la infección. La segunda causa es llamada encarnación de tejido y esto es a causa de infección alrededor del tubo y no es relacionado a la infección de oído. Este tipo de drenaje es con sangrado pero no es peligroso.

El drenaje de oído cuando un tubito está presente, es tratado con el uso de gotas oticas recetadas por el médico y no es necesario tomar antibiótico oral al menos que se lo recete el otorrino. Las únicas gotas oticas que debe usar cuando su hijo (a) tiene tubitos de ventilación son **Ciprodex** o **Floxin.** Estos dos medicamentos son aprobados por el FDA para uso en pacientes con tubitos o perforación del tambor del oído.

Si usted llega a notar drenaje o costra en el oído, favor de usar las gotas oticas recetadas (Floxin o Ciprodex):

5 gotitas al área afectada, 2 veces al día por 7 días.

Antes de aplicar las gotas, favor de limpiar el oído cuidadosamente con un pañuelo o toallita húmeda. Llenando el canal del oído con el medicamento suavemente "bombeando" la parte exterior del oído varias veces para promover que el medicamento baje al canal. Es muy importante que cuando esté usando el tratamiento evite que el agua le entre al oído.

Cuando llamar a la oficina:

Si el drenaje se resuelve con las gotas oticas, entonces hacer una cita de seguimiento cada 6 a 9 meses para que el otorrino revise los tubitos. Si el drenaje sigue o se repite seguido, favor de llamar a nuestra enfermera al **(858) 309-7706**.

Precauciones con el Agua:

Anteriormente se le recomendaba que se cuidara del agua (bañar/natación) pero esto a cambiado, la única excepción es cuando hay drenaje del oído. Si su otorrino le recomienda tapones para los oídos, hay varias opciones:

- **www.earplugsonline.com**
- Ear putty – disponible en cualquier farmacia o tienda
- Moldes disponibles por medio del departamento de Audiología en Rady Children's Hospital San Diego (estos moldes no son cubiertos por su seguro médico y se requiere hacer una cita)
- Bandas para oídos disponibles **www.earband-it.com**