

Advancing the future of pediatric healthcare...together.
Otolaringología Pediátrica

**Miringotomía bilateral post operatoria
con colocación de tubos en el tímpano**

Matthew T. Brigger, MD, MPH
Division Chief

Morgan Bliss, MD

Daniela S. Carvalho, MD, FAAP

Wen Jiang, MD

Shelby Leuin, MD

Anthony E. Magit, MD, FAAP,
MPH

Jeremy Yang, MD

Elina Kari, MD

Ethan Frank, MD

Zhen Qian, MD

Tina Friesen, MD

Vijay Patel, MD

Gopi Shah, MD

Physician Assistant:

Virginia Floco, PA-C

Sallie Reyes, PA-C

Megan Copeland, PA-C

Anita Lazar, PA-C

Kristina McCauley, PA-C

Ashley Sheng P.A.-C

Melissa Spence, PA-C

Alyssa Odneal, PA-C

Main Office:

3030 Children's Way
San Diego, CA 92123
(858) 309-7701

(858) 966-4062 Fax

Regional Offices:

Encinitas

(760) 944-5545

Escondido

(760) 755-7600

Murrieta

(951) 600-1640

Información acerca de los tubos

A su hijo le insertaron tubos en el tímpano(s). Estos permanecerán insertados por aproximadamente 6-18 meses y, generalmente, el oído los rechaza espontáneamente posteriormente. Revisaremos a su hijo periódicamente en el consultorio hasta que los tubos salgan del tímpano hacia el canal auditivo. El tubo fácilmente puede sacarse una vez que esté en el canal auditivo.

Instrucciones post operatoria

Gotas en los oídos: Inmediatamente después de la cirugía, es posible que le indiquen administrar gotas en los oídos. Use las gotas recetadas de la siguiente manera:

| | | |
|-------|---------------------------------|--|
| _____ | _____ | por _____ |
| Gotas | Veces/ Día | # de días |
| | <input type="checkbox"/> Oído D | <input type="checkbox"/> Oído I <input type="checkbox"/> Ambos |

Supuración del oído:

- Mientras los tubos están en los oídos, se puede saber si hay infección si el oído presenta supuración. La supuración puede ser turbia, mucosa, o incluso con sangre (no de color café dorado como la cerilla). Esto puede tratarse a menudo con solo gotas óticas antibióticas, en lugar de antibióticos orales.
- Si presenta supuración, use las gotas recetadas.**
5 gotas, 2 veces al día, de 5 a 7 días; o como se lo indique el médico arriba mencionado.
- Si la supuración persiste después de estas gotas, llame a su pediatra o a nuestra enfermera al 858-309-7706 para cuidado adicional.

Precauciones en el agua: En el pasado, se recomendaban precauciones en el agua a los niños con tubos en los oídos cuando se bañaban o nadaban. El enfoque ha cambiado y estas precauciones ya no se consideran necesarias en la mayoría de los casos. El médico hablará con usted si las precauciones en el agua fueran necesarias.

Dolor post operatorio:

Aunque por lo normal no es un procedimiento doloroso, si el niño tiene malestar después de la cirugía puede tomar, acetaminofén (Tylenol, Panadol), o Ibuprofeno (Motrin, Advil).

Nutrición:

Alimentación regular

Seguimiento:

La cita post operatoria será: _____

Vea la lista al margen izquierdo para localizar su consultorio.

Si su médico le ordena un audiograma y no le ha programado uno, llame a Departamento de Habla y Audición al (858)966-5838.