

Matthew T. Brigger, MD,
FAAP,MPH Division Chief

Morgan Bliss, MD

Daniela S. Carvalho, MD, FAAP

Wen Jiang, MD

Shelby Leuin, MD

Anthony E. Magit, MD, FAAP,
MPH

Jeremy Yang , MD

Elina Kari, MD

Tina Friesen, MD

Ethan Frank, MD

Zhen Qian, MD

Vijay Patel, MD

Gopi Shah, MD

Physician Assistants:

Virginia Floco, PA-C

Sallie Reyes, PA-C

Megan Copeland, PA-C

Anita Lazar, PA-C

Kristina McCauley, PA-C

Ashley Sheng, P.A.- C

Melissa Spence- PA-C

Alyssa Odenal, PA-C

Main Office:

3030 Children's Way
San Diego, CA 92123
(858) 309-7701

(858) 966-4062 Fax

Regional Offices:

Encinitas

(760) 944-5545

Escondido

(760) 755-7600

Murrieta

(951) 600-1640

Cuidado para la Timpanoplastia Post-Operatorio

1. Limitaciones en las actividades:

1. Mantener seco el oído operado (especialmente evite nadar)
2. No sonarse la nariz
3. Reducir las actividades físicas
 - Restricciones en educación física: Ninguna _____ días
 - No ir a la escuela por _____ días

2. Cuidado de la herida:

1. Si tiene una gasa puede quitarla al día siguiente de la cirugía.
2. Algodón en el oído - Cambie el algodón de 2-3 veces a día. Excepto si el algodón muestra supuración de sangre por varios días. No es necesario de colocar el algodón cuando el oído deje de supurar

3. Medicamentos:

1. Antibióticos - _____
2. Medicamentos para el dolor
 - Por lo general Tylenol o Ibuprofeno es lo único que se necesita.
 - Se puede recetar un medicamento más fuerte para el dolor como es Norco o Hycet.
3. Gotas para los oídos

_____ , _____ por _____
gotas #de gotas veces al día días

Empezar _____

4. Nutrición - Regular

5. Visita de seguimiento _____

6. Comuníquese a nuestra oficina si el paciente tiene temperatura mayor de 103°, sangrado excesivo, dolor fuerte, hinchazón o enrojecimiento detrás del oído.